


宇宙地球科学Ⅰ (第三回目)

プレートテクトニクスと ブルームテクトニクス (マントルダイナミクス)

東京大学総合文化研究科：
小宮 剛 准教授
2014/10/23


地球表層の地形



①大陸移動説


地球表層 の地形

②海洋底 拡大説




海底の縫い目 大西洋の底にある長さ1万kmに及ぶ「大西洋中央海嶺」は世界最長の山脈だ。色は海底の岩石質地殻の形成年代を示し、海嶺のそばが最も若く(赤)、大陸に近くにつれ徐々に古くなっている。

海底の年代




大陸地殻の年齢



プレートテクトニクス

地球表層部（リソスフェア）がいくつかの硬い板（プレート）に分かれしており、それらがほとんど変形することなしに相互に水平運動（球面上の回転）しているという考えに基づく理論。



プレート境界(地震で決定)






図4.28 世界の地震分布図 ($M \geq 4.0$, 深さ 100 km 以下, 1980~1998 年, 国際地震センター作成)


プレート構造

大陸プレート 海洋プレート





海の深さとプレートの年齢の相関



プレート境界(3つの境界)





図1.3 3種のプレート境界、二つのプレートが、(a)ぶつかり合う、(b)遠ざかる、(c)すれちがう。

プレート境界：3つのタイプ (1) 拡大境界




(3) 热水について



図6.16: 中央海嶺の热水循環が確認されている場所。Barkerら (1995)による。
中央海嶺での热水循環が確認されている場所
最初に見つかった所—ガラパゴス諸島沖の海底(1976年5月)

②热水噴出口(Black & White smokers)



Black smoker
(東太平洋海嶺)

White smoker
(南西諸島海域)

Black smoker: 鉱物が主体で硫黄を含んだ熱い(250°Cを超える)液体で、チムニーから噴きだした热水は透明だが、周囲の海水で冷やされて金属硫化物が凝出し、黒い煙になる。最高温度はゴルダムのBlack smoker(356°C~400°C)。
White smoker: 一般にBlack smokerより規模が小さく、流量も少なくよりゆっくり放出。また、水温もやや低く250°C以下。流体の中には、Ba, Ca, Siの化合物を含む為白い煙を吐き出す。

热水系での生命活動






図6.5 海嶺頂部での光景(Macdonald and Luyendyk, 1981).

(2) 横ずれの境界 トランスフォーム断層




プレート境界：3つのタイプ

(3) 収束境界




火成活動：特に花崗岩の生成
地震活動：変形運動
変成作用
付加体の形成

付加体と海洋プレート層序




プレートテクトニクスと原動力




F(SP): slab pull, **スラブ引っぱり力**
F(RP): ridge push

大陸移動



プレート運動とウィルソンサイクル



火山活動の分布






図1.1 世界の火山分布 [IAVCEI, 世界の活火山カタログ]

中央海嶺、沈み込み帯、ホットスポット

ホットスポット




ホットスポットとプレート運動




地球内部の微細構造

地球断面とプルームテクトニクス




プレートテクトニクスとプルームテクトニクス


地球断面とプルームテクトニクス



沈み込んだプレート(メガリス)



ダイヤモンドの炭素同位体 (-6 or -5.5‰)



①エクロジャイト
(沈み込んだ海洋地殻物質に伴う)型
ダイヤモンドは生物起源(化石)?



巨大火成岩区 と生物絶滅

